



 **VENERATE®**

Proteja a sus cultivos desde el inicio

 **Rizobacter**

Venerate XC, bioinsecticida, cuenta con múltiples modos de acción y es efectivo contra una amplia variedad de insectos masticadores, chupadores y ácaros. Además, Venerate XC ayuda a reducir la resistencia de los insectos. Puede combinarse con insecticidas biológicos o convencionales, mejorando el espectro de control y su eficacia.

## → CONTROLA EFECTIVAMENTE



Trips



Saltahojas



Chinche  
hedionda



Áfidos



Lygus

## → BENEFICIOS

- Protección de amplio espectro contra insectos chupadores y masticadores, así como ácaros.
- Actividad contra adultos y ninfas. Múltiples modos de acción.
- No es tóxico para peces, aves y la mayoría de los insectos benéficos, incluidas las abejas melíferas.

## → CONTROLA EFECTIVAMENTE

- Foliar (aérea o terrestre).
- Quimigación.
- Tratamiento del suelo.
- Pulverizador de mochila/mano.

→ **INGREDIENTE ACTIVO**

- Cepa Burkholderia spp. A396.

→ **Recomendaciones de uso (Chile)**

| CULTIVO   | PLAGA                                                       | DOSIS (L/ha) | CLAVES PARA LA APLICACIÓN                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tomate    | Pulgón verde del duraznero ( <i>Myzus persicae</i> )        | 5 - 10       | Aplicar al detectar los primeros individuos en el follaje, realizar máximo dos aplicaciones por temporada, con un intervalo de 7 días entre una aplicación y otra. Volumen de agua sugerido 1.000 L/ha.                      |
|           | Arañita bimaclada ( <i>Tetanychnus urticae</i> )            |              |                                                                                                                                                                                                                              |
| Mandarino | Pulgón ( <i>Tozoptera aurantii</i> )                        | 5            | Aplicar al detectar los primeros individuos en el follaje, realizar máximo dos aplicaciones por temporada, con un intervalo de 7 días entre una aplicación y otra. Volumen de agua sugerido 1.000 L/ha.                      |
|           | Capachito de los frutales ( <i>Naupactus cervinus</i> )     | 5 - 10       | Aplicar al detectar los primeros individuos en el follaje, realizar máximo dos aplicaciones por temporada, con un intervalo de 16 días entre una aplicación y otra. Volumen de agua sugerido 2.500 L/ha.                     |
| Naranja   | Burrito de la vid ( <i>Naupactus xanthographus</i> )        | 5 - 10       | Aplicar al detectar los primeros individuos en el follaje, realizar máximo dos aplicaciones por temporada, con un intervalo de 15 días entre una aplicación y otra. Volumen de agua sugerido 2.000 L/ha.                     |
|           | Plegador de hoja ( <i>Proeulia sp.</i> )                    | 5 - 10       | Aplicar al detectar los primeros individuos en el follaje, realizar máximo dos aplicaciones por temporada, con un intervalo de 7 días entre una aplicación y otra. Volumen de agua sugerido 2.000 L/ha.                      |
| Manzano   | Pulgón Inígero del manzano ( <i>Eriosoma lanigerum</i> )    | 5            | Aplicar al detectar los primeros estados móviles en el follaje, realizar máximo dos aplicación por temporada, con un intervalo con un intervalo de 12 días entre una aplicación y otra. Volumen de agua sugerido 2.000 L/ha. |
| Nogal     | Pulgón del nogal ( <i>Chromaphis juglandicola</i> )         | 5 - 10       | Aplicar al detectar los primeros individuos en el follaje, realizar máximo dos aplicaciones por temporada, con un intervalo de 14 días entre una aplicación y otra. Volumen de agua sugerido 2.500 L/ha.                     |
| Olivo     | Mosquita blanca del fresno ( <i>Siphoninus phillyreae</i> ) | 5 - 10       | Aplicar al detectar los primeros estados ninfales en el follaje, realizar máximo dos aplicaciones por temporada, con un intervalo de 13 días entre aplicación y otra. Valumen de agua sugerido 2.000 L/ha                    |
|           | Escama blanca de la hiedra ( <i>Aspidiotus nerii</i> )      |              |                                                                                                                                                                                                                              |

→ **Recomendaciones de uso (Perú)**

| CULTIVO   | PLAGA                                         | DOSIS     |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
| Vid       | Chanchito blanco ( <i>Planococcus citri</i> ) | 0,5 - 0,7 |
| Palta     | Queresa pequeña ( <i>Fiorinia fiorinae</i> )  | 0,5 - 0,7 |
| Mandarina | Arañiya roja ( <i>Panonychus citri</i> )      | 0,5 - 0,7 |

→ **Presentación**

- Garrafa de 10L.



[www.rizobacter.com.pe](http://www.rizobacter.com.pe)

